CURCULIONIDES NOUVEAUX DE L'ARGENTINE ET AUTRES RÉGIONS SUD-AMÉRICAINES

Par A. HUSTACHE

NAUPACTINI

L'étude plus approfondie de quelques espèces antérieurement décrites mais ne pouvant trouver place dans le tableau de ce groupe donné par F. van Emden (1) m'oblige à la création de quelques genres nouveaux dont les caractères principaux sont indiqués dans le tableau suivant.

Tous ces genres ont le menton dépourvu de soies, les hanches antérieures contiguës, les antennes normales, le scape mince à la base, plus ou moins claviforme au sommet.

1. Epimères métathoraciques visibles, découverts à l'extrémité du métasternum. Fémurs antérieurs non ou peu plus renflés que les autres. 2
   Ces mêmes épimères invisibles. Epimères et épisternes du mésosternum convergents en un même point dans l'angle huméral de l'élytre. Elytres non tuberculés au sommet de la déclivité postérieure. Tibias antérieurs au moins denticulés en dedans (*Floresianellus* excepté). 6

2. Elytres avec 10 stries ponctuées les épaules dentées. Prothorax tuberculé sur le milieu des côtés. Massue antennaire plus du double aussi longue que large. Rostre sans carènes latérales ni impression antéoculaire. Tête impressionnée derrière les yeux. Corbeilles tarsales postérieures ouvertes; tous les tibias denticulés en dédans. **Myociphus** (2) n. gen.

(1) F. van Emden, *Stett. Entom. Zeit.* 97, 1938, p. 78-86.

(2) Genotype: *M. laticeps*, n. sp. Oblong, noir, luisant, orné de bandes squamuleuses jaunes, dont deux larges sur le prothorax, trois sur chaque élytre sur les intérstries 3e, 5e, 7e, 8e, 9e, n'atteignant pas le sommet. Tête, les yeux compris, plus large que le bord antérieur du prothorax. Massue antennaire étroite, subfusiforme. Prothorax transversal, assez densément et finement pronctué, luisant. Ecusson squamulé nacré. Elytres avec leur plus grande largeur un peu avant le milieu, la dent humérale forte obtuse a son sommet, assez fortement striés ponctués, les interstries luisants.

Long. 9-13 mm. Guyane Française.

Corbeilles tarsales postérieures caverneuses. Prothorax non tuberculé sur les côtés. Massue antennaire ovale. 3

3. Tous les tibias denticulés. Epaules avec une forte dent. 4
Tibias postérieurs non denticulés. 5

4. Base du prothorax et des élytres faiblement bisinués. Tête sans impression derrière les yeux. Prothorax subcylindrique.
Elytres non comprimés sur les côtés, squamulés mais sans soies dressées (*Naupactosis Lizeri* Hust. 1926, type) **Cyphodellus** n. gen.

Bases du prothorax et des élytres fortement bisinuée. Tête impressionnée derrière les yeux. Prothorax dilaté, subanguleux sur les côtés. Elytres latéralement comprimés jusqu'au 7e interstrie, ce dernier costiforme. Dessus squamulé et hérissé de soies **Mendozella** n. gen.

5. Rostre caréné sur les côtés, avec une impression antéoculaire. Elytres non ou peu comprimés sur les côtés. Prothorax non ou faiblement bisinué à la base. Corbeilles tarsales postérieures obliques. Insecte terne. **Priocyphus** n. gen.

Rostre sans impression antéoculaire. Base du prothorax fortement bisinuée. Insectes ordinairement à coloration vive. *Erycideus* Pasc. et *Neoericydeus* Hust.

6. Pattes antérieures peu plus longues que les autres. Base du prothorax tronquée celle des élytres légèrement échancrée en arc. Tête avec une impression postoculaire. Antennes courtes le 1er article plus long que le 2e, la massue ovale, ou oblongue. Ecusson lisse. Petits insectes.
Tibias antérieurs denticulés en dedans.
Ecusson très petit. **Floresianus** n. gen.

Tibias non denticulés en dedans. Ecusson grand. Epaules moins accusées. s. gen. **Floresianellus.**

Floresianus n. gen.

Rostre oblique, continuant l'inclinaison du front, moins long que large, légèrement conique, les côtés verticaux, en dessus plan, à son sommet brièvement déprimé, l'échancrure apicale médiocre, les scrobes étroitement visibles de haut. Scrobes latéraux, profonds, flexueux, en arrière rapprochés du bord inférieur de l'oeil, en avant atteignant l'extrémité. Antennes submédianes, courtes, le scape dépassant le bord postérieur de l'oeil, le funicule court, le 1er. article plus du double aussi long que large, plus long que le 2e, le 3e et les suivants courts. Prothorax tronqué à ses extrémités. Elytres oblongs, à la base pas plus larges que le prothorax, les épaules obliques, obliquement déclives au sommet, pourvus de 10 stries, la 10e. réunie à la 9e. en avant.

Pattes courtes, densément squamulées. Fémurs inermes. Tibias droits, épais, leur mucron apical très petit, plus fort aux antérieurs, les tibias antérieurs bisinués en dedans, les corbeilles tarsales postérieures courtes, caverneuses et squamulées. Hanches antérieures contiguës et insérées un peu plus près du bord antérieur que du bord postérieur du prosternum. Segment ventral 2e. peu moins long que le 1er., aussi long que les 3e. et 4e. ensemble, la 1ère suture arquée dans le milieu.

Le génotype est:

Floresianus sordidus n. sp. (Fig. 3).

Oblong, brun noir, les antennes ferrugineuses, revêtu d'une couche de squamules imbriquées d'un brun terreux, grisâtres par places, orné d'un dessin squamuleux noir, comprenant: sur le prothorax deux bandes, sur les elytres des taches allongées sur les interstries 3-5-7; les soies grossières et très courtes sur le prothorax, sur les elytres longues, claviformes, jaunâtres et noires, implantées sur les interstries impairs.

Rostre avec son sillon médian prolongé jusque sur le vertex,sa dépression apicale pourvue de petites squamules métalliques, brillantes. Front avec les yeux un peu plus large que le bord antérieur du prothorax, les yeux fortement saillants. Massue antennaire rembrunie.

Prothorax transversal, la base un peu plus large que le bord antérieur, les côtés peu arqués, en avant largement impressionné transversalement, plus fortement sur les côtés, le sommet un peu relevé; modérément convexe, irregulièrement ponctué, la sculpture voilée par le revêtement. Ecusson très petit mais lisse.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, de moitié plus longs que larges, s'élargissant faiblement jusqu'au milieu, en arrière fortement retrécis, obtusément acuminés ensemble au sommet; sculpture peu visible, les points des stries peu serrés, en partie squamulés, les interstries pairs plans, les impairs convexes particulièrement sous les taches noires.

Pattes densément squamulées, brièvement sétulosées, les tarses bruns, le 4e. article ferrugineux avec ses ongles foncés.

Long 5,57- mm.

Buenos Aires, Flores, 18-III-1914, types, ma collection (J. M. Bosq, n° 7); prov. de Buenos Aires, III, 1907 (C. Bruch, n° 42); Luján (H. Eufrasio).

Uruguay: Montevideo, 15-V-1933 (J. Tremoleras).

Très souvent l'insecte est revêtu d'une croûte terreuse qui en voile complétement les téguments et par suite la sculpture.

s. gen. **Floresianellus** n.

Tibias antérieurs non denticulés. Ecusson grand, triangulair et lisse.

Flor. convexifrons n. sp.

Brun-noir, les antennes et les pattes rousses, le revêtement dorsal très dense, d'un brun fauve, le prothorax avec deux bandes, les élytres avec des taches plus claires, les soies des élytres blanches et noires, acuminées, implantées sur tous les interstries, peu nombreuses, très courtes, à peine soulevées sur la partie dorsale en avant, en arrière et sur les côtés nombreuses, dresées, plus longues.

Rostre à dos convexe, sans sillon médian, son impression apicale grande, avec des squamules métalliques. Front convexe, non sillonné, le vertex avec un court sillon médian. Yeux modérément convexes. Funicule antennaire avec ses deux premiers articles allongés, mais le 1er. de moitié plus long que le 2e., le 3e. plus long que large, la massue oblongue, un peu plus longue que les quatre articles précédents réunis.

Prothorax notablement moins large en avant qu'à la base, régulièrement convexe, en avant sans impression et le bord antérieur non relevé; ses squamules ovales, serrées mais non imbriquées, ses soies nulles sur le disque, excessivement courtes et peu visibles sur les côtés. Ecusson grand, triangulaire, glabre.

Elytres avec les épaules accusées, brièvement arrondies à leur sommet; convexes, les stries très fines, les interstries pairs plans, les impairs peu convexes, le 3e avec quelques taches allongées, noirâtres.

Pattes pubescentes et sétulosées, leurs squamules petites et éparses sur les tibias, piliformes sur les fémurs. Tibias antérieurs en dedans assez longuement ciliés mais avec leurs denticules extrêmement petits, réduits à quelques granules épineux.

Long. 5,5 mm.

Gobernación de la Pampa, General Pico, IV-1934, collection (J. M. Bosq, n° 22).

Cette espèce à première vue, ressemble singulièrement à la précédente; elle en diffère cependant abondamment par les caractères indiqués ci-dessus.

Fl. marginatus n. sp.

Brun noir, les antennes et les tarses (les ongles foncés excepté) ferruginen, le revêtement dorsal brun, composé de squamules lancéolées, orné d'un dessin cendré-jaune, comprenant: sur le prothorax quatre bandes longitudinales, sur les épaules une large bande latérale; pourvu en outre de soies de la couleur du fond, sur la tête et le rostre nombreuses, dressées, assez longues, sur les côtés du prothorax moins longues et éparses, sur les élytres mi-dressées, abondantes sur les côtés, la moitié postérieure, et sur la suture presque jusque sur la base, sur les tibias longues et nombreuses.

Rostre transversal, légèrement conique,en dessus plan ,son fin sillon médian prolongé jusque sur le vertex. Tête avec les yeux plus large que le bord antérieur du prothorax, les yeux fortement convexes, contre leur bord supérieur pourvus en arrière d'une touffe de soies blanches. Antennes avec le scape atteignant le bord postérieur de l'œil, le 3e. article du funicule ovale et pas plus long que large, les suivants globuleux ou transversaux et peu à peu assez fortement épaissis, la massue ovale oblongue.

Prothorax à peine plus large que long, très peu plus large à la base qu'au bord antérieur, assez fortement arqué sur les côtés, les angles antérieurs avec un court sillon transversal et d'assez longues soies, les angles postérieurs obtus; régulièrement convexe, la ponctuation fine, assez serrée, la ligne médiane dénudée. Ecusson triangulaire, grand et lisse.

Elytres avec les épaules obtusément arrondies, régulièrement convexes, les stries ponctuées très fines, peu visibles, les interstries plans.

Fémurs et tibias d'un brun ferrugineux; tibias antérieurs en dedans indistinctement granulés-râpeux.

Long. 5,2 mm.

Montevideo, Peñarol, 24-IX-1931 (J. Tremoleras). Cerro (G. Fernández).

Isla Martín García, I-1938 (M. J. Viana).

Mendozella n. gen.

Rostre ni caréné latéralement ni impressionné devant les yeux. Antennes courtes, le scape dépassant peu l'oeil, la massue courte, ovale acuminée. Elytres avec les 9e. et 10e. stries se rapprochant fortement vers le tiers antérieur. Pattes subégales, les fémurs anrieurs peu plus épais que les autres. Corbeilles tarsales postérieures

caverneuses et ascendantes. Tarses assez grêles, le 2e. article aussi long que large, triangulaire. Mésosternum avec deux plaques luisantes, sa saillie intercoxale, large, le tiers environ du diamètre de la hanche, ses épimères et épisternes confluents au même point sous l'angle élytral.

Le génotype est:

M. curvispinis Hust., Ann. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, XXXIV, 1926, p. 161 (*Tricocyphus*).

Mendoza, Paramillo (J. M. Bosq).

Priocyphus n. gen.

Rostre caréné latéralement, impressionné devant l'œil. Tête avec une légère impression, ou une tache dénudée derrière les yeux. Antennes courtes, le scape depassant peu l'œil; la massue ovale, courte. Elytres avec les 9e et 10e. stries se rapprochant vers le tiers antérieur. Pattes peu inégales, les tibias postérieurs non denticulés, leurs corbeilles caverneuses et obliques; tarses assez élancés, le 2e. article des postérieurs au moins aussi long que large. Mesosternum avec ses épimères et épisternes confluents au même point, ses plaques dénudées nulles ou peu apparentes; 2e. segment ventral seulement aussi long que les 3e. et 4e. ensemble.

Insectes squamulés et parfois hérissés de soies.

Genotype: *P. Bosqi* n. sp.

Trois espèces peuvent être rattachées à ce genre:

1. Revêtement dorsal dense, gris ou cendré, composé de squamules serrées, entremêlées de soies très courtes et couchées. 2
   Dessus squamulé et avec d'assez longues soies dressées *hirsutus* n. sp.

2. Angle huméral des élytres surmonté d'un fort tubercule dentiforme dirigé en avant. *humeridens* Hust.
   Angle huméral des élytres non denté. *Bosqi* n. sp.

P. Bosqi n. sp. (Fig. 2).

Ovale-oblong, noir, très densément revêtu en dessus de squamules cendrées, rondes, les soies des élytres microscopiques, et rares sur le disque, plus longues quoique courtes sur le bord apical, les élytres avec une petite tache dénudée, noirâtre, sur le 3e. interstrie au sommet de la déclivité postérieure.

Rostre un peu plus long que large, légèrement impressionné contre les carènes latérales, ces dernières fortes, noires, parallèles; son sillon médian profond atteignant le vertex; ainsi que la tête densément squamulé et pourvu de courtes soies. Yeux modérément convexes, suivis d'une légère impression dénudée, noire.

Antennes pubescentes et brièvement ciliées, cendrées, les deux premiers articles du funicule allongés, le 2e. de moitié plus long que le 1er., les 6e, 7e. peu plus longs que larges.

Prothorax trapézoidal, transversal, la base subtronquée, fortement rebordée, un peu plus large que le bord antérieur, les côtés légèrement dilatés en avant du milieu et sinués en dedans aux extrémités et les angles postérieurs aigus (♀) ou moins sinués sur les côtés (♂); convexe, avec trois sillons, le médian large et profond, entier, les latéraux atteignant le milieu; tout le disque couvert de fortes rugosités squamulées, obliterant plus ou moins les sillons latéraux. Ecusson petit, triangulaire, squamulé.

Elytres modérément échancrés en arc à leur base, l'angle huméral obtus mais élevé, suivi d'une dépression (plus forte chez la ♀); s'élargissant peu et les côtés peu arqués jusqu'au milieu, en arrière assez fortement rétrécis; convexes, profondément ponctués-stries, les interstries larges et fortement convexes.

Pattes densément squamulées, brièvement pubescentes; tibias intermédiaires non denticulés en dedans, les antérieurs finement; soies des corbeilles tarsales jaunes.

♂ Plus étroit, le sculpture dorsale plus forte.

Long. 8-11 mm.

Gobernación de la Pampa, General Pico, IV-1934 (J. M. Bosq).

P. hirsutus n. sp.

Ovale-oblong, noir, en dessus revêtu de squamules blanches et cendrées peu serrées, ne cachant pas entièrement les téguments, très serrées sur la tête et le rostre, le milieu du prothorax; sur les élytres très serrées sur le bord marginal (excepté en avant), sur la base du 3e. interstrie et latéralement où elles forment 3-4 petites taches; soies dorsales en majeure partie noires, très nombreuses.

Rostre à peine plus long que large, longitudinalement déprimé ses carènes squamulées, Yeux fortement convexes, suivis d'une légère impression densement squamulée. Antennes brunâtres, les deux premiers articles du funicule peu allongés, le 2e. à peine plus long que le premier.

Prothorax peu plus large que long, subcylindrique, les côtés en avant du milieu légèrement dilatés, en avant obliques, en arrière parallèles et les angles postérieurs droits, la base légèrement bisinuée, étroitement rebordée, un peu plus large que le bord antérieur; convex, couvert de fortes rugosités obliterant les sillons latéraux, le sillon médian large, profond, glabre; les soies nombreuses et mi-dressées. Ecusson petit, triangulaire, pubescent.

Elytres avec leur base fortement bisinuée, le calus huméral grand, obtus et élevé; convexes, les points des séries en avant gros, profonds, pourvus au fond d'un court poil blanc, ceux des stries 3-8 encore plus gros et plus serrés, séparant des interstries en partie désquamulés, les 7e. et 8e. costiformes dans cette région, les points des séries devenant en arrière moins gros; interstries pairs peu convexes, les impairs fortement convexes.

Pattes d'un brun rouge, densément squamulées, pubescentes; tibias antérieurs et intermédiaires denticulés en dedans et onguiculés; corbeilles tarsales intermédiaires et postérieures ascendantes, leurs soies fauves, les postérieures seules caverneuses; tarses roux, les ongles noirâtres. Bessons densément squamulé, avec de nombreux petits points dénudés et sétigères, les soies courtes, flaves.

Long. 11 mm.

Mendoza, Carrizal, 25-I-1907, ma collection (J. M. Bosq.?)

P. humeridens Hust., Ann. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, XXXIV, 1926, p. 162, pl. 1, fig. 5 (*Trichocyphus*).

Tucumán: Bañado (V. Weiser).

Trichonaupactus n. gen.

Revêtement composé d'une double pubescence; l'une dense couchée, l'autre longue dressée, hérissée même sur le prothorax, la tête et le rostre. Forme ovale, trapue. Sillon rostral profond, un peu élargi vers son milieu. Yeux assez fortement convexes. Antennes assez robustes, courtes avec une pubescence couchée et des cils longs, plus ou moins hérissés, le 2e. article du funicule de moitié plus long que le 1er., les suivants plus longs que larges, la massue oblongue, fortement acuminée, plus du double aussi longue que large. Prothorax presque deux fois aussi large que long, avec un sillon médian, vers le milieu carinulé, bordé de chaque côté d'une pubescence plus dense et plus claire. Ecusson grand, tomenteux, blanc.

Elytres ovales, courts, la base légèrement bisinuée, très étroitement rebordée. Pattes courtes, robustes, les fémurs antérieurs modérément renflés, les corbeilles tarsales ouvertes, courtes, les tarses courts, le 2e. article des postérieurs triangulaire et au plus aussi long que large.

Les espèces de ce groupe ressemblent plus à un *Priocyphus* qu'aux *Naupactus*; l'absence de squamules mais une pubescence double et dense leur donne un fasciès qui tranche sur celui des *Naupactus*, auprès desquels ce genre doit être placé.

Deux espèces, la première génotype, pouvant se distinguer ainsi:

Epaules en angle obtus, arrondies. Elytres fortement ponctués-striés les interstries convexes. Prothorax modérément arrondi sur les côtés. Revêtement dorsal brun et cendré, les interstries avec des petits taches noirâtres, les soies longues et foncées (type) ou le revêtement entièrement blanc ainsi que les soies (var. *albescens* n. var.).
♂ Forme moins large, les épaules plus obliques.
Long. 10-12 mm. *densius* n. sp.

Epaules très obliquement arrondies, à peine distinctes. Elytres finement ponctués-striés, leurs points peu visibles, les interstries subplans.
Revêtement grisâtre, varié de nombreuses petites taches d'un fauve clair.
Long. 13,9 mm. *rexus* n. sp.

densius n. sp. (Fig. 4).

Ovale oblong, noir, mat, la pubescence très dense, en dessus brune, variée de cendré, en dessous grisâtre, sur l'écusson et les côtés du sillon prothoracique dense et blanche, les interstries avec des petites taches foncées, noirâtres.

♀ Rostre aussi long que large, subplan ou légèrement et obliquement impressionné de chaque côté du milieu, le sillon médian profond, en arrière étroit et prolongé jusqu'au vertex; carénes latérales obtuses; entièrement recouvert, même sur l'impression apicale, ainsi que sur la tête d'une dense pubescence et de soies hérissées. Yeux assez fortement convexes, en dessus et en dessous, bordés d'une dense pubescence, blanche, en arrière suivi d'une tache dénudée. Antennes robustes, d'un brun-rougeâtre ou noirâtre, avec une pubescence couchée, cendrée, les cils longs, sur le dessous des articles plus nombreux, plus longs et plus hérissés; scape épaissi au sommet, ne dépassant pas ou très peu le bord postérieur de l'œil; 1er. article du funicule deux fois et demi aussi long qu'épais, le 2e. de moitié plus long que le 1er., les 6e. et 7e. moins de deux fois aussi longs que larges.

Prothorax au milieu plus de deux fois aussi large que long, en avant légèrement resserré et à peine moins large qu'à la base, les côtés modérement arqués, les angles postérieurs presque droits, la base très légèrement bisinuée et étroitement relevée, rebordée; convexe, la surface inégale, de chaque côté près des bords latéraux, vers leur milieu, avec deux impressions plus distinctes, la sculpture complètement cachée par la pubescence, la ligne médiane noire, sillonnée, bordée de pubescence blanche. Ecusson en triangle curviligne, assez grand, tomenteux, blanc.

Elytres en demi-ovale, un peu plus longs que larges, à la base légèrement échancrés en arc, les épaules distinctes, en angle obtus mais bien arrondies, en arrière de ces dernières s'élargissant peu jusqu'au milieu, en arrière fortement rétrécis et au sommet assez étroitement arrondis ensemble; modérément convexes, la déclivité postérieure forte; fortement ponctués striés et les interstries larges et convexes.

Pattes robustes pubescentes et hérissées; corbeilles tarsales ouvertes et courtes; 2e. article des tarses antérieurs triangulaire et moins long que large, celui des tarses postérieurs seulement aussi long que large. Dessous coriacé et pubescent, les plaques mésosternales luisantes.

♂. Forme plus étroite, les élytres peu plus larges que le prothorax, leurs épaules plus obliques. Rostre plus long que large, moins large. Yeux plus convexes. Antennes plus courtes. Milieu des deux premiers segments ventraux et du segment anal assez profondément impressionné.

Long. 10-12 mm.

Gobernación de la Pampa, General Pico, IV-1934 (J. M. Bosq).

var. **albescens** n. var.

Revêtement dorsal blanc, sans taches; toutes les soies blanches. Points des stries visibles, les interstries presque plans.

Même localité, une ♀, ma collection.

rexus n. sp. (♀).

Cette espèce, très voisine de la précédente, en diffère en outre des caractères indiqués au tableau par le prothorax plus court, par suite plus large, ses côtés presque rectilignes, les élytres ovoides, leur plus grand largeur avant le milieu, au sommet plus largement arrondis ensemble, les antennes plus épaisses.

Long. 13,5 mm.

Montevideo, une femelle, ma collection (J. Tremoleras).

CYLINDRORRINAE

Hyperodes Jekel, 1864

Aulametopiellus Brèthes, Physis, VIII, 1926, p. 419.

J'ai reçu récemment de mon excellent collègue J. M. Bosq un spécimen authentique de *Aulametopiellus dauci* Brèthes. Le genre *Aulametopiellus* est indubitablement synonyme de *Hyperodes* Jek. Ce dernier comprend de très nombreuses espèces en Argentine; le *H. dauci* Brèthes est très voisin de *H. vulgaris*, mais peut-être distinct, ce qu'il n'est pas possible de décider d'après un seul spécimen, peut-être pas très frais.

Hyperodes rufomarginatus n. sp.

Allongé, d'un rouge ferrugineux, luisant, les antennes (massue noire exceptée) et les pattes plus claires, la majeure partie du disque du prothorax et des élytres d'un noir brun; revêtu en dessus d'une très courte et très éparse pubescence jaune, couchée, peu visible, de soies assez longues (plus longues que la largeur d'un interstrie) mi-dressées, claires, les côtés des élytres avec une large bande, dilatée vers le sommet, de squamules grandes, rondes, serrées, translucides, recouvrant la partie rouge, cette bande peu apparente plus visible à contre jour.

Rostre large, épais, peu arqué, sétosulé, densément ruguleux, avec 3 carènes, la médiane vive, les latérales très fines. Front avec un point enfoncé. Antennes avec les deux premiers articles égaux, les suivants courts, la massue ovale, grosse et noire.

Prothorax aussi long que large, subcylindrique, les côtés peu arqués, en avant brièvement et faiblement rétréci; convexe, la ponctuation assez forte, serrée, en avant avec des traces d'une carinule médiane, la pubescence plus serrée sur la ligne médiane et les côtés. Ecusson arrondi, avec quelques petites squamules.

Elytres de moitié plus longs que larges, parallèles jusqu'au milieu, assez largement arrondis au sommet; peu convexes sur le disque, profondément ponctués-triés, les deux premières stries approfondies, les interstries étroits, éparsément pointillés, le calus postérieur obso lète.

Tibias antérieurs robustes, en dedans bisinués, ciliés.

Long, 3,5 mm.

Isla Martín García, 19-I-1938 (M. J. Viana).

Hyperodes castaneus n. sp.

Allongé, d'un marron clair, revêtu en dessus d'une pubescence cendrée couchée, peu dense, peu apparente, formée sur les élytres de très courts poils squamuleux, sur le prothorax les poils un peu plus longs.

Rostre médiocrement épais, peu arqué, en arrière subcylindrique, latéralement légèrement comprimé, ruguleux, sur le milieu avec une fine carène, sa dilatation apicale pas plus longue que large. Front étroit, moins large que le rostre, avec une profonde fovéole. Yeux assex convexes, gros. Deux premiers articles du funicule antennaire égaux.

Prothorax à peine aussi long que large, sa plus grande largeur vers le tiers antérieur, de ce point les côtés sinués en dedans en avant, en arrière convergents et rectilignes, la base faiblement bisinuée, un peu plus large que le bord antérieur; convexe, transversalement impressionné en avant et le bord antérieur relevé; ruguleux, les points assez grands mais peu profonds, entremêlés de points très petits. Ecusson allongé, lisse.

Elytres deux fois aussi longs que larges, parallèles jusqu'au tiers postérieur; disque peu convexe, le sommet de la déclivité postérieure avec le calus accusé et les interstries 2e et 3e relevés en courtes côtes; peu fortement ponctués sériés, les points serrés et pourvus au fond d'un court poil, les interstries convexes, éparsément pointillés, les 3e., 5e., 7e. sur toute leur longueur et le 2e. derrière la base jusqu'à l'impression transversale plus fortement relevés.

Fémurs épaissis et subdentés en dessous. Tibias antérieurs en dedans fortement bisinués et élargis en avant.

Long. 5 mm.

Tigre, 1938 (M. J. Viana).

Pseudhyperodes n. gen. *Cyllindrorrhinae*

Rostre indistinctement élargi en avant, ses scrobes latéraux droits, profonds, dirigés contre le milieu des yeux et les atteignant, en avant à peines visibles de haut, mais visibles de profil sur toute leur longueur. Les autres caractères comme chez *Hyperodes*.

Pseudhyperodes elongatus n. sp. (Fig. 1).

Allongé, étroit, d'un brun foncé, les antennes, les tibias et les tarses d'un ferrugineux clair; mat, revêtu de petites squamules grisâtres et serrées.

Rostre aussi long que le prothorax, droit, subcylindrique, luisant éparsément pointillé, en arrière à pointillé plus serré et au-dessus du scrobe avec un léger sillon latéral, pointillé. Front à peine aussi large que le rostre, avec une grosse et profonde fovéole médiane. Yeux peu convexes. Antennes insérées en avant du milieu du rostre, les deux premiers articles du funicule égaux, les suivants arrondis, courts, la massue ovale-oblongue.

Prothorax à peine aussi long que large, subcylindrique, les côtés très légèrement arqués, en avant largement mais faiblement rétréci, resserré et peu moins large que la base, la base subtronquée, les angles postérieurs obtusément et obliquement arrondis; convexe, le long de la ligne médiane relevé, et de chaque côté, avec deux impressions, la pontuation fine, éparse, plus serrée sur les côtés. Ecusson semi-ovalaire, ruguleux.

Elytres peu plus larges que le prothorax, trois fois aussi longs que larges, les épaules très obliques, les côtés parallèles jusqu'au quart postérieur, au sommet étroitement arrondis ensemble; subplans sur le disque, le calus postérieur fort et suivi d'une profonde impression; obliquement relevés derrière la base; profondément striés ponctués, les interstries plus larges que les stries, convexes.

Tibias antérieurs en dedans modérément bisinués et près du sommet interne subéchancrés.

Long 5-5,5 mm.

Isla Martín García, -I1938 (M. J. Viana).

ERIRRHINAE

Lixodes obtusus n. sp.

Espèce voisine de *L. fimbriatus* Pasc., dont elle diffère à première vue par le élytres à leur sommet non acuminés, mais obtusément et séparément arrondis, la forme générale un peu plus large et par suite moins allongée; le rostre est un peu plus long et un peu plus courbé, les antennes moins antérieures, le prothorax de même forme a cinq bandes noires, dénudées, plus fortement ponctuées et granulées, les granules écrasés, les bandes latérales mal limitées, formées de deux séries irrégulières de granules séparés par des intervalles squamulés; sur les elytres le 2e. interstrie (intervalle entre la suture et la 1ère. côte) beaucoup plus large que le 4e. interstrie; enfin les tibias antérieurs sont droits et non arqués comme chez l'autre espèce.

Long. 10 mm.

Tigre (M. J. Viana).

1 2

3 4

Fig. 1. — *Pseudhyperodes elongatus* Hust. (10 ×); 2. — *Priocyphus Bosqi* Hust. (5 ×); 8. — *Floresianus sordidus* Hust. (9 ×); 4. — *Trichonaupactus densius* Hust. (4,5 ×). (Photog. C. Bruch).

M. M. J. Viana m'a communiqué aussi le *fimbriatus* que j'ai en collection du Brésil, de Montevideo et de Buenos Aires.

Monius minutus n. sp.

Cette espèce est extrèmement voisine de *M. brunneus* m. dont elle diffère principalement par sa petite taille de 1,5 mm. environ; le prothorax est un peu plus large, sa ponctuation moins fine et plus serrée; les élytres ont le calus huméral plus brièvement arrondi, plus petit mais plus élevé, les interstries densément pointillés, non ou peu plus larges que les profondes et fortement ponctuées stries, ils sont moins convexes, de largeur régulière, vers le milieu non élargis.

Des 20 spécimens étudiés, provenant sont de Isla Martín García (M. J. Viana), 5 seulement sont roux et squamulés comme le *brunneus*, les 15 autres sont noirs, dépourvus de presque toutes les squamules dorsales, n' ayant conservé que celles du dessous; les antennes, les pattes, en particulier les tarses restent rouges au moins en partie, caractère spécifique que n'a pas le *M. rufinasus* Gyll. de l'Amérique du Nord et qui depuis 50 ans envahit de plus en plus les eaux françaises. Le *rufinasus* a d'ailleurs une taille intermédiaire entre celles des deux autres formes et sa squamulation différente; on sait qu'il vit immergé à la face inférieure des *Azolla*. Il serait intéressant de savoir si les *brunneus* et *minutus* ont un victus analogue.

Smicronyx argentinensis n. sp.

D'un roux pâle, le prothorax un peu plus foncé, la suture des élytres rembrunie, les tarses noirâtres. Revêtement dorsal blanc, composé de petites squamules soit linéaires, soit lancéolées, mélangées, sur les élytres peu serrées, par places un peu plus serrées et formant quelques vagues taches.

Rostre à peine plus long que le prothorax, peu arqué, assez épais, à la base squamulé, entre l'insertion des antennes plurisillonné, en avant luisant.

Prothorax oblong, aussi long que large, en avant assez largement resserré, en arrière largement arrondi sur les côtés; convexe, la ponctuation très fine, très serrée, ruguleuse, la pubescence serrée sur la ligne médiane et les côtés.

Elytres du double environ aussi longs que larges, parallèles jusqu'au milieu, modérément rétrécis en arrière; convexes, les stries fines, ponctuées, vers la base élargies, creusées, leurs points serrés, les

interstries peu convexes, très finement pointillés. Ongles connés et égaux.

Long 1,9-2,1 mm.

Isla Martín García, types, I-1938 (M. J. Viana).

Provincia de Buenos Aires (C. Bruch).

Cette espèce est de taille moindre, de coloration beaucoup plus pâle et la ponctuation du prothorax beaucoup plus fine que chez le *S. chiliensis* m.

On sait que le plus grand nombre des espèces européennes vivent sur les Cuscutes, plantes parasites de nombreuses Légumineuses, Trèfles, etc.; il serait interéssant de connaître le victus de celle-ci.

ANTHONOMINAE

Anthonomus (Leptarthrus) sulcicollis n. sp. (*Bruchi* m. *in litt.*).

Ovale, d'un brun ferrugineux, la pubescence dorsale fine, dense, sur le prothorax d'un gris jaunâtre et avec une tache basale large et courte, brune, n'atteignant pas les côtés, sur les élytres grisâtre mélangée de brunâtre, brune sur la base des 2e. et 3e. interstries.

♂ Rostre moitié de la longueur des élytres, jusqu'à l'insertion antennaire droit, densément strié ponctué et pubescent, en avant légèrement arqué, densément ponctué, glabre, d'un ferrugineux plus clair. Front un peu plus large que la moitié du rostre à sa base, impressionné, pubescent, fovéolé en arrière. Yeux gros, assez fortement convexes. Antennes ferrugineuses, insérées presque au tiers antérieur du rostre, le 1er. article plus long que les trois articles suivants ensemble, le 4e. article arrondi, le 5e. subconique et pas plus longs que larges, la massue étroite, lâchement articulée et plus longue que les 5 articles précédents ensemble.

Prothorax transversal, en avant largement et fortement resserré, les côtés arrondis en arrière, la base fortement bisinuée; fortement et irrégulièrement convexe, vers le milieu brusquement déclive en avant, le sommet de la déclivité en arête obtuse, dentelée, quadrituberculée (voir de face), derrière cette arête avec un profond sillon transversal; avec un sillon médian longitudinal et séparant 4 petits tubercules disposés en carré, dont deux sur l'arête antérieure, deux plus gros en arrière (voir de haut). Ecusson grand, convexe, subtrapézoidal et pubescent.

Elytres de un quart plus longs que larges, parallèles jusqu'au milieu, largement arrondis au sommet, les épaules brièvement arron-

dies et fortement relevées; fortement convexes, la région basale brune déclive en avant, avec une impression transversale vers le tiers antérieur, les interstries convexes, les impairs plus relevés, particulièrement vers la base oú ils sont costiformes.

Fémurs antérieurs épaissis, armés d'une forte dent triangulaire et d'une deuxième externe très petite, les autres fémurs unidentés.

Tibias antérieurs arqués, modérément bisinués en dedans.

♀ Rostre à peine plus long, un peu moins épais, en avant lisse, luisant, éparsément pointillé.

Long. 3-4,3 mm.

Buenos Aires (C. Bruch, n° 21); íd. (J. M. Bosq, n° 112).

Anthonomus Bruchi n. sp.

Oblong, le revêtement dorsal très dense d'un ocre pâle, orné d'un dessin d'un brun marron, velouté comprenant sur les élytres en arrière une bande suturale (suture et 2e. interstrie), s'élargissant en devenant cordiforme en avant (limitée par les 4es. interstries), se prolongeant sur le prothorax, en se rétrécissant, presque jusqu'au sommet; le revêtement ocré est formé sur le prothorax de squamules oblongues et imbriquées, sur les élytres de poils squamuleux fins, transversalement dirigés vers le sommet des côtes élytrales, sur les pattes de poils plus longs et moins serrés.

Rostre amplement de moitié plus long que la tête et le prothorax ensemble, modérément arqué, d'un rouge jaune, luisant, en arrière finement strié cannelé. Front peu moins large que le rostre, pubescent. Yeux grands, modérément convexes. Antennes déliées, jaunes, insérées un peu en avant du milieu, le 1er. article du funicule aussi long que les trois suivants réunis, les trois derniers croissant un peu en épaisseur, arrondis et aussi longs que larges, la massue ovale acuminée et aussi longue que les 4 articles précédents ensemble.

Prothorax subtrapézoidal, transversal, les côtés de la base au milieu très peu arqués et très faiblement convergents, les angles postérieurs droits; brièvement arqués, en avant largement resserré, rétréci et le bord antérieur moitié de la base, la base faiblement sinuée. Ecusson étroit, plus du double aussi long que large, foncé.

Elytres larges, de un quart environ plus longs que larges, subparallèles jusqu'au quart postérieur, les épaules brièvement arrondies, relevées et débordant légèrement les côtés; convexes, les stries fines, leurs points petits, peu serrés, les interstries relevés en fines côtes, ceux qui limitent le dessin brun plus épais et plus relevés

le long du dessin, la 2e. en arrière brusquement terminé par un petit tubercule.

Pattes rousses, élancées. Fémurs antérieurs épaissis, armés d'une forte dent triangulaire, les autres fémurs avec un denticule aigu. Tibias antérieurs assez fortement arqués à la base, en avant modérément dilatés en dedans et leurs deux bords subparallèles. Ongles bruns et bifides.

Long. 4 mm.

Argentine, prov. Buenos Aires, 5-IV-1929 (C. Bruch), n° 120, 121, 3 spécimens (probablement ♀♀).

C'est, parmi les *Anthonomus*, l'une des plus belles espèces.

Anthonomus paraguayanus n. sp. (♀).

Oblong, d'un rouge brique, la suture élytrale noirâtre, la pubescence dorsale blanche, très fine, peu visible, sur l'écusson tomenteuse et blanche, sur le dessous longue, blanche mais non serrée. Rostre, pattes et antennes plus clairs, d'un rouge jaune.

Rostre grêle, à peine aussi long que la tête et le prothorax, assez fortement arqué, en arrière finement ponctué mais obsolètement sillonné, en avant lisse et luisant. Front peu plus large que la moitié du rostre, sillonné au milieu, en arrière avec une petite fovéole. Tête mate, coriacée, les yeux fortement convexes. Antennes insérées vers le tiers antérieur, courtes, le 1er. article aussi long que les trois suivants ensemble, le 4e. pas plus long que large, les suivants un peu plus longs, très peu épaissis, la massue oblongue, ses articles peu serrés.

Prothorax transversal, en avant brusquement rétréci et brièvement tubuleux, sa plus grande largeur en arrière du milieu, les côtés peu arqués de la base au rétrécissement antérieur, les angles postérieurs obtus, la base de moitié plus large que le bord antérieur; convexe, transversalement impressionné en avant, la ponctuation fine, serrée et ruguleuse, la ligne médiane légèrement enfoncée en arrière et avec la pubescence plus serrée. Ecusson ovale.

Elytres à peine de moitié plus longs que larges, subparallèles jusqu'au delà du milieu, peu largement arrondis au sommet, la base distinctement rebordée de chaque côté, les épaules brièvement arrondies et non relevées; convexes, avec une légère impression transversale vers le quart antérieur; largement et profondément striés ponctués, les points serrés, les interstries un peu plus larges que les sillons, fortement convexes, coriacés, obsolétement pointillés.

Fémurs antérieurs peu épaissis, armés d'une petite dent triangulaire et aiguë; les autres fémurs avec une très petite dent. Tibias antérieurs assez fortement bisinués en dedans.

Long. 2,4-2,5 mm.

Paraguay, Ht. Paraná, Hohenau, 4 spécimens (H. Jacob), n° 156.

Anthonomus sisymbrii n. sp.

Ovale noir, submat, la base des antennes ferrugineuse, la pubescence cendrée fine et éparse, sur le milieu du prothorax plus serrée et formant une ligne, sur l'écusson dense et blanchâtre, sur les épisternes métathoraciques et les épimères très dense et formant une ligne blanche.

♀ Rostre moitié plus long que la tête et le prothorax, moyennement courbé, en arrière mat, avec un sillon antéoculaire long et profond, en dessus avec trois fines carènes, la médiane plus forte, séparées par deux faibles sillons ponctués, en avant un peu luisant, la ponctuation allongée, fine, espacée. Tête mate, éparsément ponctuée, le front moins large que le rostre, avec un court sillon médian, les yeux peu convexes. Antennes médianes, le scape atteignant juste le bord antérieur de l'œil; funicule avec son 1er. article aussi long que les deux suivants ensemble, le 4e. et les suivants courts, arrondis, graduellement un peu plus épais, la massue ovale et aussi longue que les 5 articles précédents ensemble.

Prothorax transversal, de la base au milieu peu élargi, les côtés peu arqués dans le milieu, en avant se rétrécissant modérément et les côtés légèrement étranglés, la base bisinuée, son lobe médian court et tronqué, les angles postérieurs faiblement obtus; convexe, le sillon transversal antérieur faible et le bord antérieur légèrement relevé; ligne médiane en arrière légèrement impressionnée, plus profondément à la base; ponctuation profonde, les points ovales, séparés sur le disque par des intervalles lisses, un peu luisants, et presque aussi grands que les points; en avant près de la ligne médiane, de chaque côté, avec une aire moins densément ponctuée. Ecusson semi-ovale et à peu près aussi long que large.

Elytres à peine de moitié plus longs que larges, s'élargissant légèrement jusu'au milieu, largement arrondis en arrière; convexes, le calus huméral petit et lisse; étroitement et profondément striés ponctués, les points serrés, en majeure partie glabres, les interstries faiblement convexes, rugueux, leurs poils disposés en deux séries irrégulières.

Pattes élancées, les tibias et les tarses bruns; fémurs armés d'une courte épine, les antérieurs peu plus épais et leur épine plus forte. Tibias antérieurs grêles, s'élargissant graduellement mais faiblement de la base au sommet, à la base brièvement arqués; tous mucronés au sommet. Tarses grêles. Ongles dentés.

Dessous luisant, la pubescence éparse.

♂ Rostre un peu plus court et un peu plus fortement sculpté, moins arqué.

Long. 2,2 3,2 mm.

Montevideo, Peñarol, 10-I-1931 (G. Fernández) sur *Solanum sisymbriifolium* Lam., une série de spécimens.

Anthonomus argentinensis n. sp.

Noir, les antennes à la base, les tibias, les tarses, la base des fémurs, d'un roux-jaune. Prothorax à ponctuation également répartie, sans aire moins ponctuée en avant.

Quant au reste très semblable à l'espèce précédente; le rostre est peu moins long, le prothorax plus court, plus large et plus fortement arrondi sur les côtés; la coloration des pattes et des antennes est constante chez les 6 spécimens examinés, et la taille est moindre.

Long. 1,5-2,2 mm.

Buenos Aires (Ch. Bruch), n° 134.

Cette espèce doit se rapprocher de *A. anthracinus* Boh.

Ephelops rufus n. sp.

Ovale, d'un roux testacé, la suture élytrale et le dessous plus foncés, d'un roux ferrugineux; revêtu d'une courte pubescence blanche, squamuleuse, les poils raides, légèrement soulevés, épars, sur la suture derrière l'écusson serrés et formant une tache blanche; sur le dessous la pubescence plus longue mais non serrée. Pattes courtes, les fémurs inermes, les ongles simples.

Rostre à peine aussi long que la tête et le prothorax, épais, presque droit, en arrière obsolètement strié et avec une faible carène médiane, pubescent, en avant lisse, plus fin et plus courbé chez la ♀. Front moins large que le rostre, avec une petite fovéole, les yeux peu convexes. Antennes courtes, médianes (♀) ou antémédianes (♂); scape atteignant presque le bord postérieur de l'oeil; funicule avec le 1er. article obconique et aussi long que les trois suivants ensemble, le 2e. aussi long que large, les suivants transversaux et

très serrés, ne grossissant que peu, la massue ovale et aussi longue que les 6 articles précédents ensemble.

Prothorax subconique, transversal, sa plus grande largeur à la base, les côtés obliques et faiblement arqués jusqu'au médiocre resserrement apical, la base faiblement bisinuée, son lobe médian assez avancé, tronqué; convexe, la ponctuation fine, espacée, les points piligères, leurs intervalles lisses. Ecusson arrondi, brièvement et peu densément pubescent.

Elytres à peine de moitié plus longs que larges, s'élargissant en arrière jusqu'au tiers postérieur, largement arrondis au sommet, les épaules accusées; convexes, les stries fines, mais leurs points assez gros, serrés, entamant les interstries, en arrière devenant petits, les interstries vers la base pas plus larges que les stries, en arrière plus larges, plans, finement et assez densément pointillés; chaque elytre en arrière avec une tache plus ou moins ferrugineuse et plus ou moins distincte.

Fémurs antérieurs un peu plus épais que les postérieurs, inermes. Tibias droits. Tarses courts, le 3e. article fortement bilobé, les ongles bruns et simples.

Long. 1,6-1,8 mm.

Argentine: Isla Martín García, I-1938 (M. J. Viana), 8 spécimens.

Cette espèce est rattachée au genre *Ephelops* Dietz quoique le 4e. article tarsal (*onychium*) ne soit pas tout à fait aussi long que les 1er. et 2e. ensemble, et que les fémurs soient inermes; ce dernier caractère n'est pas d'ailleurs donné comme générique, et se retrouve, dans le genre voisin *Epimechus* Dietz dont une spèce a les fémurs inermes, les autres les ayant dentés.

C'est la seconde espèce du genre, l'autre le genotype *E. triguttatus* Dietz habite les Etats-Unis.

Paraceratopus Brèthes, *Tychiinae* (*Lignyodina* Bed.)

Rostre cylindrique, court, ses scrobes subapicaux, passant immédiatement en dessous, séparés en dessous en arrière. Antennes insérées vers les trois cinquièmes (♀) ou les deux tiers (♂) du rostre, courtes; scape épaissi au sommet et n'atteignant pas l'oeil; funicule de 6 articles pourvus de quelques cils squamuleux blancs, le 1er. à peine plus long que large, subglobuleux, aussi épais que le sommet du scape, le 2e. aussi long que large, les suivants fortement transversaux, graduellement épaissis, très serrés, les 5e. et 6e. faisant partie de la massue, dont ils ne peuvent être distingués que par la

nature et la couleur de la pubescence, la massue noire à fine et dense pubescence brune, couchée, peu plus longue que large, son 1er. article à sa base tronqué et de la largeur du 7e. article. Tête convexe, le front aussi large que le rostre, les yeux ovales, grands, peu convexes, largement séparés en dessus et en dessous, leurs facettes assez grossières.

Prothorax transversal, tronqué en avant et sans lobes oculaires, légèrement bisinué à la base. Ecusson petit.

Elytres un peu plus larges que le prothorax, faiblement bisinués à la base, les épaules accusées, au sommet largement arrondis et laissant le pygidium découvert; striés-ponctués.

Pattes médiocres; fémurs claviformes, les antérieurs plus épais et fortement dentés, les autres très finement dentés.

Tibias comprimés graduellement élargis, les antérieurs avec un fort mucron apical, les autres avec un très petit mucron. Tarses courts, le 4e. article long, ses ongles profondément bifides.

Prosternum avec son bord antérieur échancré en arc, le bord postérieur tronqué. Hanches antérieures contiguës, les intermédiaires étroitement séparées, les postérieures largement séparées et la saillie postérieure subtriangulaire. Abdomen avec ses segments arqués à leurs extrémités, le 2e. ne recouvrant pas le 3e., beaucoup plus long au milieu que le 3e., derrière les hanches aussi long que le 1er., la 1ère. suture dans le milieu fine et légèrement sinuée. Insecte squamulé.

Ce genre est caracterisé par le funicule antennaire de 6 articles mais les 5e. et 6e. difficiles sont à séparer de la massue, la conformation des pattes, la dent des fémurs antérieurs forte, triangulaire, rappelant celle de certains *Anthonomus;* la conformation des segments abdominaux le rattache aux *Lignyodini* Bed.

P. sphaeralceae Brèthes.

Paraceratopus nigritus n. sp. (1)

Oblong noir, mat, les antennes (derniers articles exceptés), les tibias et les tarses d'un ferrugineux plus ou moins foncé. Revêtu en dessus de petites squamules oblongues, cendrées, serrés sur les élytres, espacées sur le disque du prothorax; sur le dessous d'une pubescence squamuleuse cendrée, dense.

(1) M. M. J. Viana a eu l'obligeance de comparer sa nouvelle espèce au génotype et a constatê qu'elle en est distincte quoique très voisine.

Rostre à peine aussi long que le prothorax peu arqué, en arrière densément et assez fortement ponctué, squamulé à la base, en avant luisant et éparsément pointillé. Tête et front très densément pointillés.

Prothorax transversal, en avant fortement rétréci, brièvement et faiblement resserré, sa plus grande largeur à la base, les côtés obliquement arqués, convergents jusqu'au rétrécissement apical, les angles postérieurs droits, brièvement acuminés, la base presque du double de la largeur du bord antérieur; convexe, transversalement déprimé en avant; criblé de points arrondis, plus serrés, ruguleux sur les côtés, avec une courte ligne médiane lisse.

Elytres peu plus larges que le prothorax, de moitié plus longs que larges, parallèles jusqu'au quart postérieur; peu convexes, obliquement déclives en arrière, le calus postérieur effacé; finement et régulièrement striés ponctués, les interstries larges, plans, très densé ment ponctués. Pygidium visible de haut et pubescent. Tibias droits.

♂ Rostre un peu plus court, plus fortement ponctué et squamulé. Base de l'abdomen légèrement impressionnée.

Long. 3,5 mm.

Argentine: Isla Martín García, I-1938, 5 spécimens; I-1934, 1 spécimen. Tigre (M. J. Viana)

Observation I. — Dans le Colept. Cat. W. Junk, pars 138, 1934, l'auteur Klima a mis en tête de ce groupe une série de genres se distinguant des *Tychius* s. st. par la conformation du 2e. segment ventral, et dont Bedel (Fn. Bass. Scine, VI, 1888, p. 66) a fait la section *Lignyodini*, section malencontreusement supprimée et à rétablir.

Observation II. — Le même catalogue indique p. 4. *Tylopterus* Lec. 1876, nom préoccupé par *Tylopterus* Cac. 1867, Hypérides, pars 137, p. 4. Le nom de Leconte devant être changé, je propose de le remplacer par *Neotylopterus* et *Tylopterus Lizeri* (*Ligeri* err.). Hypéride, est à reporter aux Hypérides, pars 137, p. 4.

CRYPTORRHYNCHINAE

Conotrachelus Vianai n. sp.

Rhomboidal, brun foncé, mat, les antennes et les tarses ferrugineux, le revêtement dorsal fin, d'un jaune de sable, sur le prothorax formant quatre bandes peu tranchées, sur les élytres peu visible,

mais le long des côtés plus serré et formant quelques petites mouchetures, dont une plus distincte sur la base du 3e. interstrie, sur les pattes et le dessous en avant plus grossier, serré d'un jaune grisâtre, l'abdomen noir imponctué mat, dénudé, excepté sur le 5e. segment densément pubescent et les bords des 3e. et 4e. segments.

Rostre plus long que la tête et le prothorax, assez robuste, peu arqué, dans sa moitié postérieure densément pubescent et avec une carène médiane vive et deux carinules latérales, en avant dénudé, luisant, pointillé (♂) ou plus long, en arrière peu pubescent, ses carènes moins visibles, en avant lisse, obsolètement pointillé (♀). Tête densément pubescente, le front avec un point enfoncé. Antennes médianes, le 2e. article peu moins long que le 1er., le 7e. presque aussi long que large.



Fig. 5. — Antenne droite du *Conotrachelus Vianai* Hust. ♀.

Prothorax aussi long que large, sa plus grande largeur au milieu et en ce point les côtés pourvus de 2-3 granules, les côtés en arrière, légèrement sinués en dedans, les angles postérieurs légèrement aigus et un peu relevés, la base fortement bisinuée; convexe, alutacé, mat, la ponctuation indistincte, avec une forte carène médiane abrégée en arrière, avec de chaque côté une légère impression longi-

tudinale atteignant en avant la faible impression transversale, limitée extérieurement par une fine élevation granuleuse; devant l'écusson un groupe de petits granules disposés en arc. Ecusson ovale, élevé.

Elytres plus longs que larges, se rétrécissant peu jusqu'au milieu, fortement en arrière, étroitement arrondis ensemble au sommet, les épaules arrondies et relevées; fortement convexes, les interstries 3, 5, 7, 9 en fortes côtes, entières, la suture et les interstries pairs très plans, plus larges que les points des séries, ces derniers en avant gros et serrés, graduellement moindres en arrière, très petits ou indistincts vers le sommet. Fémurs avec un anneau cendré peu tranché, tous avec une forte dent triangulaire. Tibias antérieurs bisinués en dedans, fortement chez le ♂.

♂. Ventre avec une courte impression semiovalaire sur le milieu du bord postérieur du 1er. segment, le 5e. segment avec trois fovéoles.

Long. 9,5-10,5 mm.

Isla Martín García, I-1938 (M. J. Viana).

Uruguay: Montevideo, Carrasco, 1908 (J. Tremoleras).

Conotrachelus bidenticulatus n. sp.

Rhomboidal, brun, le rostre, les antennes, les tibias et les tarses ferrugineux, le revêtement dorsal fin, brun fauve et cendré, le prothorax de chaque côté avec une étroite bande cendrée n'atteignant pas le sommet, les élytres avec une large bande transversale antérieure cendrée, séparée de la base par une étroite bande brune, interrompant les deux premières côtes dorsales.

Rostre: ♀, des trois quarts de la longueur des élytres grêle, fortement arqué, luisant, à la base finement pointillé, obsolètement caréné; ♂, mois long, un peu plus épais, en arrière en dessus finement caréné, latéralement plus fortement ponctué substrié. Antennes médianes (♀) ou un peu plus antérieures (♂), fines et allongées, le 2e. article de un quart moins long que le 1er. et plus long que les 3e. et 4e. ensemble, les suivants très peu épaissis, le 7e. aussi long que large, la massue étroite oblongue subfusiforme.

Prothorax aussi long que large, en avant brusquement, fortement et largement tubuleux, les côtés obliquement mais faiblement convergents de la base à la tubulure et légèrement sinués, les angles postérieurs obtusément arrondis, la base fortement bisinuée; convexe, en avant profondément impressionné transversalement et le

bord antérieur relevé, longitudinalement trisillonné, le sillon médian en avant séparant deux petits tubercules fasciculés, la ponctuation espacée et peu visible. Ecusson ovale, pubescent.

Elytres plus longs que larges, subparallèles dans leur moitié antérieure, largement arrondis ensemble au sommet, les épaules obtusément arrondies et relevées, la base étroitement rebordée; convexes, brièvement et obliquement déprimés derrière la base; suture et interstries impairs relevés en fines côtes, la suture, les 1e. et 2e. côtes interrompues en avant par la bande cendrée, les autres côtes entières, les interstries dorsaux pairs, plans, larges, plus larges que les points des séries, ces points médiocrement profonds en avant, très petits vers le sommet; le long des côtés, quelques très courtes soies blanches.

Fémurs unidentés, la dent des antérieurs petite et aiguë. Tibias antérieurs droits, non sinués en dedans.

Long. 4,9-5 mm.

Isla Martín García, I-1938 (M. J. Viana).

Conotrachelus pollux n. sp. (♂).

Ovale rhomboidal, brun, assez luisant, la pubescence dorsale très fine, cendrée et ocracée, sur le prothorax très éparse, peu apparente, mais condensée en formant six petits points cendrés transversalement disposés sur son milieu, sur les élytres formant en arrière de petites taches, sur la base plus serrée, ocracée et formant une tache contre l'épaule. Fémurs avec un anneau cendré.

Rostre aussi long que la tête et le prothorax, modérément arqué en avant, robuste, en arrière latéralement comprimé, finement ponctué carinulé, en dessus tricaréné, les carènes fines, entre l'insertion antennaire avec une petite fovéole, en avant lisse et luisant. Tête ruguleuse, le front fovéolé. Antennes insérées vers le tiers apical, ferrugineuses, le 1er. article de un tiers plus long que le 2e., le 3e. et les suivants courts, graduellement élargis.

Prothorax aussi long que large, ses côtés parallèles jusqu'au tiers antérieur, ensuite arqués convergents jusqu'à l'étroit resserrement apical, la base subtronquée et les angles postérieurs droits; peu convexe, la ponctuation très serrée, les points d'inégale grosseur, la ligne médiane avec une fine carène. Ecusson allongé, élevé, impressionné.

Elytres triangulaires, plus longs que larges, les épaules arrondies et un peu relevées, les côtés subparallèles dans leur moitié antérieure;

interstries 3, 5, 7, 9 relevés en fines côtes tranchantes et entières, le 8e. convexe, les autres interstries et la suture plans, lisses, les stries régluières, leurs points subcarrés, modérément profonds, serrés, moins larges que les interstries.

Pattes ferrugineuses, les tarses plus clairs, leur pubescence éparse; dent des fémurs antérieurs petite, celle des autres plus forte.

Long. 8 mm.

Tigre; isla Martín García, 1928 (M. J. Viana).

Espèce voisine de *C. heteropunctatus* m., dont elle diffère par son prothorax à côtés plus parallèles, sa ponctuation plus profonde et plus serrée, ses élytres plus courts, moins convexes, la coloration différente du revêtement.

(*Concluirá en el próximo número*).